

ИМЕ НА ВЛП	АКТИВНО ВЕЩЕСТВО	КАРЕНТЕН СРОК	ФАРМАЦЕВИЧНА ДОРМА
Делтафарм Концентрат за разтвор за кожа за говеда, овце и кучета	Deltamethrin 50mg/ml	месо и вътрешни органи - 7 дни, мляко: говеда - нула дни, овце - не се разрешава за употреба при животни, чието мляко е предназначено за човешка консумация	Концентрат за разтвор за кожа
SPOTINOR 10 mg/ml разтвор за прилагане върху ограничен участък за говеда и овце	Deltamethrin 10 mg/ml	месо и вътрешни органи: говеда - 17 дни, овце - 35 дни; мляко: говеда - нула дни, овце - не се разрешава за употреба при животни, чието мляко е предназначено за консумация от хора	Разтвор за прилагане върху ограничен участък
Deltanil 10 mg/ml Pour-on Solution за говеда и овце	Deltamethrin	говеда: месо и вътрешни органи: 17 дни мляко: нула часа овце: месо и вътрешни органи: 35 дни мляко: нула часа	Разтвор за поливане
ДЕЛТАБЕТО - 5	Deltamethrin 50 g/l	месо и вътрешни органи - 14 дни, мляко - 7 дни	Емулсия за кожа
БУТОКС 50	Deltamethrin 5 g/100 ml	месо и вътрешни органи: говеда - нула дни, овце - 4 дни; мляко: говеда - нула дни, овце - не се разрешава за употреба при животни, чието мляко е предназначено за консумация от хора	Концентрат за разтвор за кожа за къпане и напръскване
IVERTIN LA	Ivermectin 10 mg/ml	Говеда: Месо и вътрешни органи: 49 дни. Не се разрешава за употреба при крави, чието мляко е предназначено за консумация от хора. Не се разрешава за употреба при	Инжекционен разтвор

		нелактиращи млечни крави, включително бременни млечни юници, чието мляко е предназначено за консумация от хора в продължение на 60 дни преди очакваното раждане. Овце: Месо и вътрешни органи: 21 дни. Не се разрешава за употреба при овце, чието мляко е предназначено за консумация от хора. Не се разрешава за употреба при овце, чието мляко е предназначено за консумация от хора в продължение на 60 дни преди очакваното раждане. Прасета: Месо и вътрешни органи: 14 дни.	
ИВЕРЗАНТЕЛ инжекционен разтвор	Ivermectin 5 mg/ml Closantel 125 mg/ml	Месо и вътрешни органи: 49 дни. Мляко: не се разрешава за употреба при животни, чието мляко е предназначено за човешка консумация	Инжекционен разтвор
CLOSAMECTIN 5 mg/ml/125 mg/ml инжекционен разтвор за овце	Ivermectin 5 mg/ml Closantel 125 mg/ml	месо и вътрешни органи: говеда - 49 дни; овце - 28 дни, за целия текст виж SPC	Инжекционен разтвор
INTERMECTIN Super, 10 mg/ml+100 mg/ml инжекционен разтвор за говеда	Ivermectin 10 mg/ml Clorsulon 100 mg/ml	месо и вътрешни органи: говеда и овце - 66 дни; мляко - не се разрешава за употреба при животни, чието мляко е предназначено за консумация от хора, не се разрешава за	Инжекционен разтвор

		употреба при нелактиращи млечни крави, включително бременни юници в рамките на 60 дни от отелването.	
ДУФАМЕК БГ 1 % инжекционен разтвор	Ivermectin 10 mg/ml	Месо и вътрешни органи: Говеда – 49 дни; Овце – 42 дни; Свине – 28 дни; Не се разрешава за употреба при животни, чието мляко е предназначено за консумация от хора.	Инжекционен разтвор
CRIMECTIN INJ - BG	Ivermectin 10 mg/ml	месо и вътрешни органи: говеда - 49 дни, овце - 21 дни, кози и свине - 28 дни; мляко - не се разрешава за употреба при животни, чието мляко е предназначено за консумация от хора	Инжекционен разтвор
КЕПРОМЕК РАЗТВОР ЗА ПОЛИВАНЕ	Ivermectin 5 mg/ml	месо и вътрешни органи: говеда - 28 дни; мляко - не се разрешава за употреба при животни, чието мляко е предназначено за консумация от хора, не се разрешава за употреба при нелактиращи млечни крави, вкл. бременни юници в рамките на 60 дни след отелване	Разтвор за поливане
АЛФАМЕК 1 %	Ivermectin 10 mg/ml	месо и вътрешни органи - говеда - 49 дни, свине - 28 дни, мляко - не се разрешава за употреба при животни, чието мляко е	Инжекционен разтвор

		предназначено за човешка консумация	
ПАНДЕКС 1% инжекционен разтвор за говеда, овце, кози и свине	Ivermectin 10 mg/ml	месо и вътрешни органи: говеда - 49 дни; овце, кози и свине - 14 дни; мляко - не се разрешава за употреба при животни, чието мляко е предназначено за консумация от хора	Инжекционен разтвор
IVERMECTIN SS	Closantel 125 mg/ml Ivermectin 5 mg/ml	месо и вътрешни органи - 49 дни; мляко - не се разрешава за употреба при животни, чието мляко е предназначено за консумация от хора	Инжекционен разтвор
IVOMEC SUPER	Ivermectin 10 mg/ml Clorsulon 100 mg/ml	месо и вътрешни органи - 66 дни, мляко - не се разрешава за употреба при животни, чието мляко е предназначено за консумация от хора	Инжекционен разтвор
Керпомес Super Inj. инжекционен разтвор за говеда	Ivermectin 10 mg/ml Clorsulon 100 mg/ml	месо и вътрешни органи: говеда - 66 дни; мляко - не се разрешава за употреба при животни, чието мляко е предназначено за консумация от хора	Инжекционен разтвор
Керпомес инжекционен разтвор за говеда, овце и свине	Ivermectin 10 mg/ml	месо и вътрешни органи: говеда - 49 дни, овце - 39 дни, свине - 25 дни; мляко - Не се разрешава за употреба при животни, чието мляко е предназначено за консумация от хора.	Инжекционен разтвор
ПРОМЕКТИН	Ivermectin 10 mg/ml	месо и вътрешни органи: говеда - 49	Инжекционен разтвор

		дни; свине - 29 дни; не се разрешава за употреба при животни, чието мляко е предназначено за консумация от хора	
INTERMECTIN, 10 mg/ml инжекционен разтвор за говеда, кози, овце и свине	Ivermectin 10 mg/ml	месо и вътрешни органи: говеда - 49 дни, овце и кози - 28 дни, свине - 21 дни; мляко - не се разрешава за употреба при животни, чието мляко е предназначено за консумация от хора. Да не се използва при нелактиращи млечни крави, включително бременни юници до 60 ден от отелването.	Инжекционен разтвор
ЕКОМЕКТИН 10 mg/ml инжекционен разтвор	Ivermectin 10 mg/ml	месо и вътрешни органи: говеда - 49 дни, овце - 42 дни, свине - 28 дни; мляко - не се разрешава за употреба при животни, чието мляко е предназначено за консумация от хора, за целият текст виж SPC	Инжекционен разтвор
DIACIDOL	DIAZINON 60 g/100 ml	месо и вътрешни органи - 28 дни, мляко - 7 дни	
ЕНДЕКТОВЕТ 1 % инжекционен разтвор за говеда, овце и свине	Doramectin 10 mg/ml	оведа: Месо и вътрешни органи: 70 дни. Не се разрешава за употреба при животни, чието мляко е предназначено за консумация от хора. Да не се прилага при бременни крави или юници, чието мляко	Инжекционен разтвор

		е предназначено за консумация от хора в продължение на 2 месеца преди очакваното раждане. Овце: Месо и вътрешни органи: 70 дни. Не се разрешава за употреба при животни, чието мляко е предназначено за консумация от хора. Да не се прилага при бременни овце, чието мляко е предназначено за консумация от хора в продължение на 70 дни преди очакваното раждане. Прасета: Месо и вътрешни органи: 77 дни. Елени: Месо и вътрешни органи: 70 дни. Не се разрешава за употреба при животни, чието мляко е предназначено за консумация от хора. Да не се прилага при бременни животни, чието мляко е предназначено за консумация от хора в продължение на 2 месеца преди очакваното раждане.	
ДЕКТОМАКС 10 mg/ml инжекционен разтвор за говеда, овце и прасета	Doramectin 10 mg/ml	месо и вътрешни органи: говеда и овце - 70 дни, не се разрешава за употреба при животни, чието мляко е предназначено за консумация от хора,	Инжекционен разтвор

		за целия текст виж SPC	
Elivec 5 mg/ml разтвор за поливане за говеда	Eprinomectin 5 mg/ml	Месо и вътрешни органи: 15 дни. Мляко: нула часа.	Разтвор з поливане
ЕПРИФАРМ Разтвор за поливане за говеда	Eprinomectin 5 mg/ml	месо и вътрешни органи - 15 дни, мляко - нула часа	Разтвор за поливане
EPRINEX Multi 5 mg/ml pour-on разтвор за говеда за месо и мляко, овце и кози	Eprinomectin 5 mg/ml	месо и вътрешни органи: говеда - 15 дни, овце - 2 дни, кози - 1 ден; мляко - нула часа	Разтвор за поливане
EPRECIS 20 mg/ml инжекционен разтвор за говеда, овце, кози	Eprinomectin 20 mg/ml	Говеда: месо и вътрешни органи - 63 дни. Мляко - нула часа. Овце: месо и вътрешни органи - 42 дни. Мляко - нула часа. Кози: месо и вътрешни органи - 42 дни. Мляко - нула часа.	Инжекционен разтвор
UNOMEC 5 mg/ml разтвор за поливане за говеда и млечни крави	Eprinomectin 5 mg/ml	месо и вътрешни органи -15 дни, мляко - нула часа	Разтвор за поливане
EPRIZERO 5 mg/ml разтвор за поливане за говеда за месо и мляко	Eprinomectin 5 mg/ml	месо и вътрешни органи - 10 дни, мляко - нула часа	Разтвор за поливане
Неопринил 5 mg/ml разтвор за поливане при говеда	Eprinomectin 5 mg/ml	месо и вътрешни органи: 15 дни; мляко: нула часа.	Разтвор за поливане
ЕКТОМИН спрей, спрей за кожа, емулсия за говеда, овце, кози и кучета	Cypermethrin 10 g/100 ml	овце - месо и вътрешни органи: 7 дни; говеда- месо и вътрешни органи: 28 дни. Мляко: Не се разрешава за употреба при животни, чието мляко е предназначено за консумация от хора.	Спрей за кожа, емулсия
ЦИПЕР ВЕЕКС	Cypermethrin 10 g/100 ml	месо и вътрешни органи: говеда, овце - 7 дни, мляко - не се разрешава за употреба при животни, чието мляко е	Емулсия за поливане

		предназначено за консумация от хора	
ДИАЦИП	Dimpylate 25 g/100 ml Alpha-cypermethrin 1,5 g/100 ml	месо и вътрешни органи - 7 дни, мляко - 7 дни	Емулсия за поливане
ЦИПЕРМЕТРИН ФАРМА Разтвор за кожа за говеда, овце и кучета	Cypermethrin 10 g/100 ml	месо и вътрешни органи: говеда, овце - 28 дни; мляко - не се разрешава за употреба при животни, чието мляко е предназначено за консумация от хора	Разтвор за кожа
ЕКТОМИН спрей, спрей за кожа, емулсия за говеда, овце, кози и кучета	Cypermethrin 0, 2 g/100 ml	месо - 7 дни, вътрешни органи - 14 дни, мляко - не се разрешава за употреба при животни, чието мляко е предназначено за консумация от хора	Спрей за кожа, емулсия
Amitraz 12.5 % емулсия за локално приложение	Amitraz 12.5 g	Месо и вътрешни органи- 7 дни, мляко 4 дни	Емулсия за локално приложение